


ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談件数の推移

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)
N=4,719




ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要①

〔居住市町別〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)


N=4,719



ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要②


〔居住市町別 1月分〕

相談件数(令和6年1月1日～令和6年1月31日)
N=75



ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要③

〔性別〕




相談者の男女比は約6対4で女性が多い

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要④

〔性別 1月分〕

相談件数(令和6年1月1日～令和6年1月31日)
N=75




女性の相談者が半数を超える結果となった

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑤

〔年代〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)

N=4,719




相談の当事者はあらゆる年代に及ぶが、30代・40代・50代が全体の約半分を占める

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑥

〔年代 1月分〕

相談件数(令和6年1月1日～令和6年1月31日)

N=75




50代が最も多く、次いで70歳以上が多い結果となった

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑦

〔既往歴〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)
N=4,719




- 有
- 無
- 未回答

既往症があると答えた者は約3割

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑧

〔療養区分〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)
N=4,719




自宅療養が8割以上、入院療養を経た方は1割以下

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑨

〔相談者の症状持続期間〕


相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)
N=4,719



ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑩

〔相談者の症状持続期間 1月分〕

相談件数(令和6年1月1日～令和6年1月31日)
N=75




ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑪

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)

複数選択可「症状なし及び不明」「その他」の者を除く。

令和5年4月より「倦怠感・発熱・筋肉痛」を「倦怠感」「発熱・筋肉痛」に分けて集計



「倦怠感・発熱・筋肉痛」、「呼吸器症状」が多く、
その他多岐にわたる症状の訴えがある。


(参考)その他症状 : 頭痛、鼻づまり、耳閉感、嘔声、口渇、動悸、月経不順、性機能障害
集中力低下、だるさ、不眠、めまい、ふらつき、ブレインフォグ等

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑫

〔主な症状 1月分〕

相談件数(令和6年1月1日～令和6年1月31日)
複数選択可「症状なし及び不明」「その他」の者を除く。

「呼吸器症状」が最も多く次いで「倦怠感」「痛み」が多い。



(参考)その他症状 : 副鼻腔炎、眼が重い、耳閉感、ブレインフォグ、口渇、耳鳴り
脚のだるさ、鼻づまり、性機能障害、体重減少、不眠

ひょうご新型コロナ後遺症相談ダイヤル における後遺症相談の概要⑬

〔年代別の主な症状〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年1月31日)
(「症状なし及び不明」の者を除く。複数択可)

40代を除き1位「倦怠感・発熱・筋肉痛」、2位「呼吸器症状」となった。3位は「嗅覚・味覚障害」が多く(40代以上・未回答)、続いて「精神・神経症状」(20代～40代)が多かった。10代以下では「痛み」という結果になった。

年代	1位		2位		3位	
10歳未満	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	呼吸器症状	22%	痛み	16%
10代	倦怠感・発熱・筋肉痛	36%	呼吸器症状	16%	痛み	15%
20代	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	呼吸器症状	26%	精神・神経症状	12%
					嗅覚・味覚障害	
30代	倦怠感・発熱・筋肉痛	32%	呼吸器症状	27%	精神・神経症状	12%
40代	呼吸器症状	31%	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	精神・神経症状	11%
					嗅覚・味覚障害	
50代	倦怠感・発熱・筋肉痛	28%	呼吸器症状	27%	嗅覚・味覚障害	14%
60代	倦怠感・発熱・筋肉痛	29%	呼吸器症状	26%	嗅覚・味覚障害	16%
70歳以上	倦怠感・発熱・筋肉痛	35%	呼吸器症状	16%	嗅覚・味覚障害	12%
未回答	倦怠感・発熱・筋肉痛	36%	呼吸器症状	26%	嗅覚・味覚障害	12%