

関係機関・団体・課・室長 様

兵庫県農政環境部長

平成 2 8 年度 兵庫県農業気象技術情報第 1 号 (5 月情報) について (送付)

このことについて、下記のとおり情報を作成しましたのでお送りします。

記

1 気象経過・予報から想定される栽培上の留意点と対応策

作物	地域	栽培上の留意点	対 応 策
水稲	全県共通	<p>1 栽培 天気は数日の周期で変わるが、降水量が多く、日照時間は短く、気温は高くなると見込まれる。 苗の温度管理に留意する。</p> <p>2 病害虫 苗いもちの発生に留意する。 苗立枯病の発生は育苗期の急激な温度変化により助長される。</p>	<p>1 栽培 浸種時間を長めに取り、十分に催芽させて播種する。播種はうす播きをし、育苗時の温度管理と灌水に留意し、軟弱徒長しないように健苗の育成に努める。 白化苗を防止するため、緑化前の苗では寒冷紗等で、3～4日被覆し、徐々に馴らす。 ムレ苗を防止するため、トンネル内の換気に努め、急激な温度変化を避ける。</p> <p>2 病害虫 発病を未然に防ぐため、トンネル内の換気に努め、過湿を避ける。 夜間の過湿を避けるため、夕方の灌水はしない。 苗いもち、苗立枯病が発生したら、薬剤防除を行う。</p>
麦	全県共通	<p>1 生育状況及び生育予測 出穂期はかなり早くなっており、成熟期は平年より早くなると予想される。 降雨により、一部のほ場で湿害が発生している。</p>	<p>1 生育状況及び生育予測 排水溝の手直しを徹底して、排水対策に努める。特に乗用管理機による赤かび病防除後は、車輪で崩れた排水溝の手直しをしっかりと行う。 成熟期が早まると予想されるので、子実水分が25%以下を目標に、適期収穫に努める。</p>

農業技術センター(加西市)における生育状況

	本年 ^{※1}	平 年 ^{※2}	
	出穂期	出穂期	成熟期
シロガネコムギ	4/5	4/17	6/4

※1 播種は 11月 6日 (平年比-3日)
※2 平年値は直近7ヶ年から最高・最低を除いた平均値

<p>2 病害虫 降水量は平年よりやや多いと予想される。赤かび病は開花期の高温・多雨で多発しやすいので発生に留意する。</p>	<p>2 病害虫 発病を未然に防ぐために、小麦、六条大麦ともに開花始期から開花期までの間に1回目、さらに10日後に2回目の薬剤散布を行う。 ※「病害虫発生予察防除情報第2号」(平成28年4月11日)を参照のこと。</p>
---	--

作物	地域	栽培上の留意点	対応策										
キャベツ	全県共通	<p>1 栽培</p> <p>(1) 初夏どりでは、肥料切れを起こさないようにする。</p> <p>(2) 雑草の発生に注意する。</p> <p>(3) 降雨による滞水を避ける。</p> <p>(4) 高温時は、降雨等により急激に結球肥大が進み、裂球するため穫り遅れないよう適期収穫に努める。</p> <p>2 病害虫</p> <p>菌核病の発生がやや多いと予想されるので、今後の発生の動向に注意する。スリップス類の発生が近年多いので注意する。</p>	<p>1 栽培</p> <p>(1) 適期に追肥を行う。</p> <p>(2) 雑草の発生前～初期に中耕を兼ねて除草する。</p> <p>(3) 排水溝の整備を行い、谷上げ等により排水性を高める。</p> <p>(4) 春キャベツでは、8分結球程度で収穫する。初夏どりでは締まり具合を確認し、結球緊度のそろったものを選択収穫する。</p> <p>2 病害虫</p> <p>「病害虫発生予察情報」「兵庫県農薬情報システム」を参考に適正に防除する。</p>										
果樹	全県共通	<p>1 生育</p> <p>(1) 生育は、全般的に昨年比や平年比でやや早い。</p> <p>農業技術センターにおける樹種別の生育状況</p> <table border="1" data-bbox="331 1153 1284 1451"> <tbody> <tr> <td>クリ※1</td> <td>展葉昨年比約3日早い（平年比一週間程度早い） 凍害の発生が認められる。</td> </tr> <tr> <td>ブドウ※1</td> <td>発芽、展葉ほぼ昨年並み（ほぼ平年並み）</td> </tr> <tr> <td>モモ※1</td> <td>満開期ほぼ昨年並み（平年比約5日早い）</td> </tr> <tr> <td>ナシ※2</td> <td>満開期昨年比約2日早い（平年比約4日早い）</td> </tr> <tr> <td>温州ミカン※3</td> <td>発芽昨年比約3日早い（平年比約3日早い）</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 加西市 ※2 朝来市 ※3 南あわじ市</p> <p>(2) 4月中旬の風雨による病害、結実不良の発生に留意する。</p> <p>(3) 幼木は乾燥による生育不良にならないよう留意する。</p> <p>(4) 晩霜害を受けた園では適切な対応を行う。</p>	クリ※1	展葉昨年比約3日早い（平年比一週間程度早い） 凍害の発生が認められる。	ブドウ※1	発芽、展葉ほぼ昨年並み（ほぼ平年並み）	モモ※1	満開期ほぼ昨年並み（平年比約5日早い）	ナシ※2	満開期昨年比約2日早い（平年比約4日早い）	温州ミカン※3	発芽昨年比約3日早い（平年比約3日早い）	<p>1 生育</p> <p>(1) 生育が平年比でやや早いことから、着果管理や防除の時期を見極め、適期管理に努める。</p> <p>(2) 開花期（4月）の多雨により病害が発生しやすい樹種では、薬剤の予防散布につとめる。結実不良による変形果が発生しやすい樹種では、摘果時に変形果の判別を慎重に行う。</p> <p>(3) 土壌が乾燥する場合は、灌水を行う。</p> <p>(4) 晩霜害等による被害果がある場合は、果実を見極めるため摘果を遅らせる。凍害をうけたクリ、サンショウ、イチジク樹では、発芽、展葉が健全な部分まで早めに切り戻し、新梢伸長を促す。</p>
クリ※1	展葉昨年比約3日早い（平年比一週間程度早い） 凍害の発生が認められる。												
ブドウ※1	発芽、展葉ほぼ昨年並み（ほぼ平年並み）												
モモ※1	満開期ほぼ昨年並み（平年比約5日早い）												
ナシ※2	満開期昨年比約2日早い（平年比約4日早い）												
温州ミカン※3	発芽昨年比約3日早い（平年比約3日早い）												


◎水稲・麦の栽培については、「稲・麦・大豆作等指導指針」を、防除については「病害虫発生予察情報」及び「兵庫県農薬情報システム」を参考にすること。

※本情報は、4月26日時点のデータを元に作成しています。

2 気象予報


(1) 近畿地方の向こう 1 か月予報 (4月23日～5月22日)

[平成28年4月28日 大阪管区气象台発表]



(2) 近畿地方の向こう 3 か月予報 (5月～7月)

[平成28年4月25日 大阪管区气象台発表]



※ 気温・降水量・日照時間は低い・平年並・高い(少ない・平年並・多い)の3階級で予報されます。階級の幅は、平年値の作成期間(1981～2010年)における各階級の出現率が33%となるように決めてあります。

ホームページアドレス

- ・ 「病虫害発生予察情報」
<http://hyogo-nourinsuisangc.jp/chuo/bojo/index.htm>
- ・ 「兵庫県農薬情報システム」
<http://www.nouyaku-sys.com/nouyaku/user/top/hyogo>
- ・ 「Web 水稻生育予測システム」
<http://www.aginfo.jp/RGP/>
- ・ 「小麦赤かび病を適期に防除するための開花期予測システム」
http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/laboratory/karc/2011/180a0_01_33.html

問い合わせ先

本情報に関すること

- ・ 兵庫県農政環境部農林水産局農産園芸課 TEL (078)341-7711(代表)
農産班:主作・機械担当 内線 4074
農産班:野菜担当 内線 4054
花き果樹班 内線 4066

技術内容に関すること

- ・ 県立農林水産技術総合センター
企画調整・経営支援部 TEL (0790)47-2435
農業技術センター 農産園芸部 TEL (0790)47-2410
農業技術センター 病虫害部 TEL (0790)47-1222
北部農業技術センター 農業・加工流通部 TEL (079)674-1230
淡路農業技術センター 農業部 TEL (0799)42-4880

兵庫県ホームページでも本情報を公開しています。

URL : http://web.pref.hyogo.lg.jp/af11/af11_000000097.html

(兵庫県トップページ>食・農林水産>農業>農作物>農業気象技術情報)