

HIDWR

兵庫県感染症発生動向調査週報(速報) 2026 年第 26 週 (6 月 22 日~6 月 28 日) 兵庫県感染症対策センター (兵庫県立健康科学研究所)

Hyogo Infectious Diseases Weekly Report

全国の情報は国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトホームページにてご覧ください。 <https://id-info.iihs.go.jp/>

定点把握感染症 (指定された医療機関から報告を求める感染症です)

手足口病

定点あたり患者数は今週 **3.94 人** (先週 2.88 人) と増加しました。
地域的には、神戸市、姫路市、明石市及び加古川保健所管内で警報レベルとなっています。

新型コロナウイルス感染症

定点あたり患者数は今週 **1.01 人** (先週 0.72 人) と増加しました。

水痘

定点あたり患者数は今週 **0.45 人** (先週 0.51 人) と減少しました。
地域的には、明石市及び伊丹保健所管内で注意報レベルとなっています。

基幹定点把握対象感染症の罹患数 (※括弧内は定点あたりの患者数)

無菌性髄膜炎 1 人 (0.07 人)、マイコプラズマ肺炎 2 人 (0.14 人)

※ 2025 年 4 月 7 日 (第 15 週) より、定点数が変更となりました。

※ 2025 年 4 月 7 日から、急性呼吸器感染症が追加になりました。詳しくは厚生労働省ホームページ (急性呼吸器感染症(ARI)) をご覧ください。

<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html>

全数把握感染症

1 類感染症	報告はありません。
2 類感染症	結核 10 人 (保健所：神戸市 5 人、姫路市 1 人、西宮市 2 人、豊岡管内 1 人、洲本管内 1 人)
3 類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 3 人 (①神戸市；有症者；男性 20 歳代；O157 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染、②尼崎市；有症者；男性 1 歳；O26 VT1；感染地域：兵庫県；感染経路：不明、③加古川保健所管内；無症状病原体保有者；女性 60 歳代；O 不明 VT2；感染地域：兵庫県；感染経路：経口感染) (累積報告数 32 人；有症者 18 人、HUS 0 人)
4 類感染症	重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) 1 人 (豊岡保健所管内；女性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染) 日本紅斑熱 1 人 (神戸市；女性 70 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：動物・蚊・昆虫等からの感染) レジオネラ症 1 人 (宝塚保健所管内；無症状病原体保有者；男性 80 歳代；感染地域：兵庫県；感染経路：不明)

5 類感染症	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 3 人 (①神戸市; 男性 50 歳代; <i>Escherichia coli</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 医療器具関連感染、②加東保健所管内; 女性 70 歳代; <i>Klebsiella pneumoniae</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 医療器具関連感染、③豊岡保健所管内; 男性 70 歳代; <i>Klebsiella aerogenes</i>; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 手術部位感染) 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1 人 (神戸市; 女性 80 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 創傷感染) 後天性免疫不全症候群 (HIV 感染症を含む) 1 人 (無症状病原体保有者; 感染地域: 不明; 感染経路: 同性間性的接触) 侵襲性肺炎球菌感染症 4 人 (①神戸市; 男性 1 歳; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 飛沫・飛沫核感染; ワクチン接種歴: 4 回有、②神戸市; 女性 80 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明、③西宮市; 女性 80 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明、④加東保健所管内; 男性 70 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 飛沫・飛沫核感染; ワクチン接種歴: 無) 水痘 (入院例) 1 人 (神戸市; 臨床診断例; 女性 70 歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明) 梅毒 5 人 (①神戸市; 早期顕症梅毒Ⅱ期; 男性 30 歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明、②尼崎市; 無症状病原体保有者; 男性 30 歳代; 感染地域: 国内; 感染経路: 異性間性的接触、③姫路市; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 男性 30 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、④芦屋保健所管内; 早期顕症梅毒Ⅰ期; 男性 20 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触、⑤加古川保健所管内; 無症状病原体保有者; 男性 30 歳代; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 異性間性的接触) 百日咳 2 人 (①西宮市; 女性 20 歳代; 感染地域: 不明; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 4 回有、②伊丹保健所管内; 男性 5 歳; 感染地域: 兵庫県; 感染経路: 不明; ワクチン接種歴: 不明)
2026 年 25 週までに診断されたものの報告遅れ	結核 1 人 (保健所: 丹波管内)

ダニ媒介感染症 (重症熱性血小板減少症候群・日本紅斑熱)

今週、**重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)** 及び**日本紅斑熱**の報告が**各々 1 人**ありました。今年の累積患者数は重症熱性血小板減少症候群 (SFTS) が 5 人、日本紅斑熱が 4 人となっています。

これらは主に病原体 (ウイルスやリケッチア) を保有するマダニに咬まれることで感染します。

SFTS は SFTS ウイルスを病原とし、主な症状は原因不明の発熱、嘔吐・下痢などの消化器症状、血小板減少、白血球減少などが認められ、重症化すると死に至ることもあります。潜伏期間は 6～14 日です。一方、日本紅斑熱はリケッチア・ジャポニカを病原とし、主な症状は発熱、発疹、刺し口が赤く腫れ中心部がかさぶたになるのが特徴です。潜伏期間は 2～8 日で、治療にはテトラサイクリン系の抗菌薬等が投与されます。

マダニの活動が活発となる春から秋にかけて、ハイキングや草むらに入る場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用して肌の露出を少なくする、虫よけスプレーを活用する、帰宅後すぐに入浴し着替えるなどの予防対策が必要です。また、山野へ入った 2 週間以内に発熱や発疹が出た時はすぐに受診し、その時の行動を伝えることが重要です。

※2026 年 4 月 6 日から、多剤耐性緑膿菌感染症が、全数把握対象感染症に追加になりました。

この週報はホームページ (https://web.pref.hyogo.lg.jp/iphs01/kansensho_jyoho/infectdis.html) にも掲載しています。

2026 年 3 月 24 日から H P が新しくなりました。旧 H P は、一部を除き、閲覧出来なくなりましたのでご注意ください。

また <https://id-info.jihs.go.jp/> から国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイトの週報 (IDWR) がダウンロードできます。