


兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口における後遺症相談件数の推移

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)

N=5,081




兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要①

〔居住市町別〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)


N=5,081



兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要②


〔居住市町別 9月分〕

相談件数(令和6年9月1日～令和6年9月30日)
N=35



兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要③

〔性別〕




相談者の男女比は約6対4で女性が多い

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要④

〔性別 9月分〕

相談件数(令和6年9月1日～令和6年9月30日)

N=35




女性が7割を超える結果となった

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑤

〔年代〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)
N=5,081




相談の当事者はあらゆる年代に及ぶが、30代・40代・50代が全体の約半分を占める

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑥

〔年代 9月〕

相談件数(令和6年9月1日～令和6年9月30日)
N=35




70歳以上が最も多く、次いで60代・50代が多い結果となった

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑦

〔既往歴〕

相談件数(令和4年7月1日～令和6年9月30日)
N=5,081



既往症があると答えた者は約3割


兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑧

〔療養区分〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年8月31日)

N=5,046

入院等 約2%
宿泊等 約2%



- 自宅
- 自宅, 宿泊
- 自宅, 入院
- 自宅, 未回答
- 宿泊
- 宿泊, 入院
- 入院
- 未回答


自宅療養が8割以上、入院療養を経た方は1割以下

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑨

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)

N=5,081

〔相談者の症状持続期間〕




兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑩

相談件数(令和6年9月1日～令和6年9月30日)

N=35

[相談者の症状持続期間 9月]




兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑪

〔主な症状〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)

複数選択可「症状なし及び不明」「その他」の者を除く。

令和5年4月より「倦怠感・発熱・筋肉痛」を「倦怠感」「発熱・筋肉痛」に分けて集計




「呼吸器症状」、「倦怠感・発熱・筋肉痛」の順に多く、
その他多岐にわたる症状の訴えがある。

(参考)その他症状 : 頭痛、鼻づまり、耳閉感、口渇、動悸、多汗、月経不順、性機能障害、聞こえにくさ
集中力低下、だるさ、不眠、傾眠傾向、めまい、ふらつき、ブレインフォグ、微熱等

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン 接種相談窓口における後遺症相談の概要⑫

〔主な症状 8月分〕

相談件数(令和6年9月1日～令和6年9月30日)
複数選択可「症状なし及び不明」「その他」の者を除く。



「倦怠感」が最も多く次いで「呼吸器症状」が多い

(参考)その他症状 : 微熱

兵庫県新型コロナウイルス後遺症・ワクチン接種相談窓口における後遺症相談の概要⑬

〔年代別の主な症状〕

相談件数(令和4年7月7日～令和6年9月30日)
 (「症状なし及び不明」の者を除く。複選択可)

「倦怠感・発熱・筋肉痛」が全世代で最も多い結果となった。2位は「呼吸器症状」が最も多く、3位は「嗅覚・味覚障害」、次いで「精神・神経症状」、「痛み」が多い結果となった。

年代	1位		2位		3位	
10歳未満	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	呼吸器症状	22%	痛み	18%
10代	倦怠感・発熱・筋肉痛	37%	呼吸器症状	15%	痛み	14%
20代	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	呼吸器症状	26%	精神・神経症状 嗅覚・味覚障害	12%
30代	倦怠感・発熱・筋肉痛	31%	呼吸器症状	27%	精神・神経症状	12%
40代	倦怠感・発熱・筋肉痛 呼吸器症状	30%	嗅覚・味覚障害	12%	精神・神経症状	11%
50代	倦怠感・発熱・筋肉痛	29%	呼吸器症状	26%	嗅覚・味覚障害	14%
60代	倦怠感・発熱・筋肉痛	30%	呼吸器症状	26%	嗅覚・味覚障害	16%
70歳以上	倦怠感・発熱・筋肉痛	35%	呼吸器症状	16%	嗅覚・味覚障害	14%
未回答	倦怠感・発熱・筋肉痛	37%	呼吸器症状	25%	嗅覚・味覚障害	12%