

9 糖尿病について

(1) 糖尿病の診断

問4 1 これまでに医師から糖尿病と言われたことがありますか。(1つ)


- 1 なし・・・85.4%
- 2 あり・・・12.5%
- 無回答・・・2.0%



糖尿病と言われたことの有無は、「なし」が85.4%、「あり」が12.5%となっている。

地域別では、「あり」は、西播磨(20.3%)が最も多く、以下、淡路(17.1%)、中播磨(15.6%)となっている。

性別では、「あり」は、男性が19.6%、女性が7.2%と、男性が女性の倍以上となっている。

性年代別では、「あり」は、男性では60代で最も割合が多くなっている。女性は20代から70代にかけて、年齢が上がるにつれ「あり」の割合が多くなっている。





(2) 糖尿病の治療状況

問42 [問41で2を選択した方におたずねします]

糖尿病の治療を受けたことはありますか。(1つ)


1 現在受けている	48.9%
2 以前に受けたことがあるが、現在は受けていない	9.9%
3 ほとんど治療を受けたことがない	40.3%
無回答	0.8%


(N=285)

問41で医師から糖尿病と言われたことが「ある」と答えた方の、糖尿病の治療状況は、「現在受けている」が48.9%、「前に受けたことがあるが、現在は受けていない」が9.9%、「ほとんど治療を受けたことがない」が40.3%だった。

地域別では、「ほとんど治療を受けたことがない」人は、東播磨(48.5%)が最も多く、以下、神戸(47.6%)、但馬(45.9%)となっている。

性別では、「ほとんど治療を受けたことがない」人は、男性が42.7%、女性が35.7%と、男性の方が多くなっている。





(3) 糖尿病の治療法

問43 [問43～45は問42で1か2を選択した方におたずねします]

あなたが受けたことのある糖尿病の治療法を選んでください。

(当てはまるもの全て)


- 1 食事療法・・・49.3%
- 2 運動療法・・・32.9%
- 3 飲みぐすり・・・70.2%
- 4 インスリン注射・・・14.2%
- 5 その他・・・0.3%
- 無回答・・・2.0%

(N=168)

受けたことのある糖尿病の治療法では、「飲みぐすり」が70.2%と最も多く、以下、「食事療法」(49.3%)、「運動療法」(32.9%)、「インスリン注射」(14.2%)となっている。

地域別では、治療法のうち、「食事療法」が多いのは、阪神南(88.9%)と東播磨(70.6%)であり、その他の地域では「飲みぐすり」の割合が多くなっている。

性別では、「運動療法」は、男性は24.0%、女性は48.1%と、女性の方が24.1ポイント多くなっている。



	食事療法	運動療法	飲みぐすり	インスリン注射	その他	無回答
神戸	36.4%	45.5%	54.5%	9.1%	0.0%	9.1%
阪神南	88.9%	44.4%	55.6%	22.2%	0.0%	0.0%
阪神北	23.5%	23.5%	82.4%	17.6%	0.0%	0.0%
東播磨	70.6%	47.1%	64.7%	23.5%	0.0%	0.0%
北播磨	24.0%	8.0%	80.0%	20.0%	0.0%	0.0%
中播磨	60.9%	26.1%	82.6%	4.3%	0.0%	0.0%
西播磨	34.4%	18.8%	78.1%	12.5%	0.0%	0.0%
但馬	57.9%	31.6%	73.7%	15.8%	0.0%	0.0%
丹波	57.7%	34.6%	76.9%	7.7%	3.8%	0.0%
淡路	33.3%	20.8%	79.2%	8.3%	4.2%	4.2%

	食事療法	運動療法	飲みぐすり	インスリン注射	その他	無回答
男性	42.7%	24.0%	69.5%	15.3%	0.4%	2.9%
女性	60.7%	48.1%	71.0%	12.3%	0.0%	0.0%



(4) 眼底検査の受診状況

問44 [問43～45は問42で1か2を選択した方におたずねします]
 眼底検査(目の奥を写真で調べる検査)を受けたことがありますか。(1つ)
 1 なし・・・31.6%
 2 あり・・・65.5%
 無回答・・・3.0% (N=168)

眼底検査の有無は、「なし」が31.6%、「あり」が65.5%となっている。

地域別では、「あり」は、北播磨(80.0%)が最も多く、以下、東播磨(76.5%)、但馬(73.7%)となっている。


性別では、「あり」は、男性が67.5%、女性が63.0%と、男性の方が多くなっている。



(5) 合併症の発症状況

問45 [問43～45は問42で1か2を選択した方におたずねします]
 次の合併症にかかっていますか。(当てはまるもの全て)
 1 神経障害(手足がしびれる、感覚がにぶくなるなど)・・・14.1%
 2 網膜症(眼底に出血がある、視力の低下など)・・・7.9%
 3 足壊疽・・・2.0%
 4 その他・・・72.9%
 無回答・・・14.6%
 (N=168)

合併症の発症状況は、「神経障害」が14.1%、「網膜症」が7.9%、「足壊疽」が2.0%となっている。



	神経障害 (手足がしびれる、 感覚がにぶくなるなど)	網膜症 (眼底に出血がある、 視力の低下など)	足壊疽	その他	無回答
神戸	18.2%	9.1%	0.0%	81.8%	9.1%
阪神南	11.1%	11.1%	0.0%	77.8%	22.2%
阪神北	11.8%	17.6%	0.0%	76.5%	0.0%
東播磨	11.8%	5.9%	5.9%	70.6%	23.5%
北播磨	16.0%	4.0%	4.0%	76.0%	8.0%
中播磨	13.0%	0.0%	4.3%	65.2%	21.7%
西播磨	12.5%	3.1%	0.0%	71.9%	15.6%
但馬	15.8%	5.3%	0.0%	73.7%	5.3%
丹波	19.2%	3.8%	3.8%	61.5%	15.4%
淡路	16.7%	20.8%	4.2%	45.8%	25.0%

	神経障害 (手足がしびれる、 感覚がにぶくなるなど)	網膜症 (眼底に出血がある、 視力の低下など)	足壊疽	その他	無回答
男性	17.5%	9.7%	2.8%	72.1%	8.8%
女性	6.4%	4.8%	0.8%	70.9%	21.1%