

第3期二ホンザル管理計画 令和4年度事業実施計画

資料編

令和4年4月

兵庫県

目 次

1	これまでの経過と現状	1
(1)	これまでの取組	1
(2)	分布状況	3
(3)	地域個体群と群れの状況と推定生息数	3
(4)	農業被害の推移	4
(5)	農業被害の現状	5
(6)	各群れの集落への出没状況	6
(7)	サル監視員の設置状況	7
(8)	防護柵の設置状況	7
(9)	サル追い犬の育成状況	8
(10)	捕獲数の推移	9
(11)	災害に強い森づくり（野生動物育成林整備 他）の実施状況	11
2	遺伝解析について	13
(1)	ミトコンドリアDNA	13
(2)	Y染色体遺伝子	14
(3)	常染色体遺伝子の分析	16
3	計画の実施体制	17

その他の研究成果などについては、兵庫県森林動物研究センターのホームページを参照願います

<https://wmi-hyogo.jp/>

1 これまでの経過と現状

(1) これまでの取組（表－1）

年 度	内 容	事業等
平成 16 年～ 18 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・生息動態調査 ・サル追い払い・追跡支援、サル有害捕獲支援 	サル出没総合対策事業
平成 19 年～ 20 年度	H19 年 4 月 兵庫県森林動物研究センター開設 <ul style="list-style-type: none"> ・サル追い払い・追跡支援、サル有害捕獲支援 ・被害防止柵設置実証展示 ・サル追い払い犬育成 	サル出没総合対策事業
平成 21 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・第 1 期ニホンザル保護管理計画策定 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援 	サル被害総合対策事業
平成 22 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル被害総合対策事業
平成 23 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	緊急雇用就業機会創出事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
平成 24 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル被害総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	緊急雇用就業機会創出事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・住民への位置情報提供システムの整備 ・問題個体識別捕獲の実施 	
平成 25 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・第 2 期ニホンザル保護管理計画策定 	
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル被害総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	緊急雇用就業機会創出事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員マニュアル作成 ・サル出没・被害情報共有システムの整備 	
平成 26 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル出没対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	緊急雇用就業機会創出事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
平成 27 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル出没対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	サル監視員配置支援事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業
平成 28 年度	<ul style="list-style-type: none"> ・サル有害捕獲支援事業 	サル出没対策事業 鳥獣被害防止総合対策事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・サル監視員設置 	サル監視員配置支援事業
	<ul style="list-style-type: none"> ・捕獲檻設置、防護対策 	鳥獣被害防止総合対策事業

平成 29 年度	・第 2 期ニホンザル管理計画策定	
	・加害レベル判定開始	
	・サル有害捕獲支援	サル有害捕獲支援事業
	・サル監視員設置	サル監視員配置支援事業
平成 30 年度	・サル有害捕獲支援	サル有害捕獲支援事業
	・サル監視員設置	サル監視員配置支援事業
令和元年度	・第 2 期ニホンザル管理計画変更	
	・野生群と餌付け群を分けた管理を開始	
	・サル有害捕獲支援	サル有害捕獲支援事業
	・サル監視員設置	サル監視員配置支援事業
令和 2 年度	・サル有害捕獲支援	サル有害捕獲支援事業
	・サル監視員設置	サル監視員配置支援事業
令和 3 年度	・サル有害捕獲支援	サル有害捕獲支援事業
	・サル監視員設置	サル監視員配置支援事業

(2) 分布状況

現在、県内には少なくとも15～16群が確認されており、平成29年7月に美方A群が鳥取県へ移動したため1群減少したが、令和元年度に大河内C群が分裂し1群増加した。群れに属する個体の生息頭数は全体で960頭と推測されるが、近隣県と比較すると群れ数、個体数とも少ない状況にある。

群れの生息が確認されている地域は、餌付け群を含めて6地域、9市町（神河町、佐用町、豊岡市、香美町、朝来市、丹波篠山市、丹波市、洲本市、南あわじ市）である。各地域には1～5群が含まれているが、相互に孤立している。特に但馬北部の豊岡市および香美町には、それぞれ10～30頭規模の群れが各1群生息しているだけで、地域的な絶滅が危惧される。

また、篠山地域個体群の2群（篠山A群、B群）は京都府側にも行動域を持ち、それぞれ三和A群、園部A群の名称で京都府の第二種特定鳥獣管理計画に位置づけられている。

ハナレザルは主に群れの行動域内やその付近で散発的に目撃され、一部に農業被害や生活被害を起こす個体が存在する。まれに、群れの生息地から遠く離れた地域で出没する事もあり、対応が難しくなる場合がある。なお、県内には餌付け群が2地域に存在しており、それぞれの管理主体により継続的な管理がされているが、長期的な展望は必ずしも明確ではなく、管理計画も現在のところ策定されていない。



図－1 兵庫県内のニホンザル生息状況

(3) 地域個体群と群れの状況と推定生息数

令和3年3月末時点での兵庫県下のニホンザル地域個体群と群れの状況を表－2に示す。

大河内・生野地域個体群は群の規模が大きかったC群が分裂し、地域個体群は4群となった。豊岡地域個体群は1群のみでオトナメスが10頭、群れ全体の推定生息数も36頭と少ない。篠山地域個体群は、平成25年度に新たな群れが確認され全体で5群となった。

美方地域個体群は、A群が平成29年7月に鳥取県に移動した後、有害捕獲により11頭中10頭が殺処分された。平成25年度にA群から分裂したB群はオトナメス4頭、全体で17頭となっている。

また、存在が疑われていた佐用餌付け群からの派生群は、オトナメス4頭、全体で19頭であることを確認した。

表－2 兵庫県下のニホンザル地域個体群と群れの状況及び推定生息数（単位：頭）

地域個体群	群れ	オトナ			ワカモノ			コドモ	0歳	不明	推定生息数	新生児保有率	調査年月
		メス	オス	不明	メス	オス	不明						
大河内・生野	大河内A	8	1	1	0	0	1	9	5	0	25	0.63	R3.9
	大河内B	5	1	0	1	0	0	1	2	0	11	0.20	R3.12
	大河内C	16	4	0	0	4	3	26	4	0	57	0.25	R3.9
	大河内D	22	3	0	1	4	3	17	13	0	63	0.59	R3.9
豊岡	城崎A	9	5	0	3	1	0	9	3	0	36	0.40	R1.12
美方	美方B	6	1	0	1	0	1	2	3	0	14	0.25	R3.11
篠山	篠山A	12	3	1	0	1	0	4	12	0	23	1.00	R4.1
	篠山B	13	6	0	1	1	0	11	10	0	42	0.77	R3.9
	篠山C	12	3	3	0	1	0	19	4	0	42	0.33	R3.12
	篠山D	12	1	0	0	0	5	5	7	0	30	0.58	R3.8
	篠山E	13	2	0	0	0	2	8	6	0	31	0.46	R3.8
小計											375		
佐用	佐用餌付け群	33	8	0	4	3	0	25	6	0	79	0.22	R3.9
	同 派生群	4	2	0	1	1	0	9	2	0	19	0.50	R2.12
淡路	淡路餌付け群	227	45	0	0	0	42	116	24	0	454	0.11	R2.8
小計											554		
合計											929		

（令和4年3月末現在）

- *大河内C群は、令和2年度調査時にカウントの機会が無く、令和元年9月調査の数値を使用した。
- *城崎A群は、令和2年度調査時にカウントの機会が無く、令和元年12月調査の数値を使用した。
- *大河内B群は、頭数に一部数え落としの可能性がある。
- *大河内D群は、令和元年度に大河内C群より分裂した。
- *淡路餌場群は大阪大学の調査による。
- *佐用派生群は、令和2年度のカウントで確認した。

(4) 農業被害の推移

県下全域の農業被害の推移（平成3年度～令和2年度）を、面積及び金額ごとにグラフで示す。（図－2）

農業被害金額は、平成9年度をピークとして減少傾向にあったが平成18年度から増加に転じた。対策が進み出した平成23年度に金額、面積ともに半減したが、平成24、25年度の被害額はやや増加した。これはサルの変遷の変化によって、対策の手薄な地域で被害が新たに発生したためであり、平成26年度以降、サル監視員活動や電気柵設置等の防護対策の充実によって金額、面積ともに減少している。

ただし、図－2の被害状況集計では、販売作物の被害のみが報告されており、家庭菜園での被害や耕作放棄などによる作付けそのものの減少は反映されておらず、過疎化や高齢化が進んでいる地域では家庭菜園を中心とした被害が継続している。




図2 ニホンザルによる農業被害の推移

平成 21 年度以降の地域個体群ごとの農業被害金額の推移を図-3 に示す。大河内・生野地域個体群は平成 23 度に激減した後平成 25 年度に大きく増加したが、B群が行動域を北方（朝来市側）に拡大して対策の取られていない地区での被害が大きかったため、対策が進み出した平成 26 年度以降は減少している。豊岡地域個体群は、平成 27 年度以降、微増ではあるが増加傾向にある。美方地域個体群は、平成 21 年度に被害金額のピークを迎えたあとは減少傾向にある。篠山地域個体群は、平成 22 年度に大きな被害を出しその後少なくなったものの継続的な減少傾向はみられない。

餌付けされた群れがいる地域では、佐用では平成 21、22 年度に農業被害を多く出しているがその後は減少している。佐用では H25 年度以降、淡路では平成 26 年度以降、被害金額は報告されていない。




図-3 地域個体群別の農業被害金額

(5) 農業被害の現状

令和元年度の農業集落への野生動物被害に関する農会アンケート調査の結果を図-4 に示す。

農業集落への調査を見る限り、生息地付近では深刻な被害と報告している集落もあり、局地的ではあるが被害が大きいことがわかる。

なお、生息地から離れた地域での被害は、ハナレザルによる被害が中心と考えられる。

また、農業被害以外では、住居への侵入や屋根瓦の破損等の生活被害、人を威嚇するなどの精神被害も一部地域で報告されている。





図-4 ニホンザルによる集落の被害状況 (令和2年度)


(6) 各群れの集落への出没状況

群れの集落への出没程度を明らかにするために、年度ごとの接近割合を図5、6に示した。



- * 城崎A群のH29年度はデータが少なく表示していない。
- * 美方B群は分裂が始まったH24年12月以降の結果で、H25年5月以降はH27年3月～10月を除いて目視のみの調査結果。平成28年度以降は、テレメトリー調査。
- * 大河内A群はH25年7月から12月25日までの間は目視のみの調査結果。
- * H23年度の大河内C群は発信器が装着できなかったため目視による出没状況結果。
- * 大河内D群はデータが少ないため、表示していない。
- * 令和元年度は11月30日までの調査結果。

図-5 豊岡、美方、大河内・生野地域個体群各群れの集落への接近割合 (H22～R2年度)



- * 篠山E群はH24年1月以降の調査結果。
- * 令和3年度は11月30日までの調査結果。

図-6 篠山地域個体群各群れの集落への接近割合 (H22～R2年度)

“目視”及び“目視できないが付近にいる”を集落への出没（以下、集落依存度とする）とすると、平成24年度以降は、出没割合の高い群れで90%、低い群れで15%程度あるが、大河内・生野地域個体群の3群と美方B群以外はすべて50%以上の出没程度であり集落依存度が高い。

群れ別にみると、城崎A群は平成30年度以降、減少傾向にあるものの集落依存度が約80%と非常に高い状態で推移している。美方B群は平成26年度以降減少傾向にある。大河内・生野地域個体群のA～Cの3群は、集落への出没割合が比較的低い群れで出没頻度は低下傾向にあったが、平成26年度以降にA群が行動域を変化させ増加している。篠山地域個体群は、A～D群は近年減少傾向にあるが、何れも集落依存度が高く推移している。E群は、集落依存度が減少傾向にあったが、平成28年度以降、行動域を変化させ増加傾向にある。

このように、追い払い等の被害対策の効果により、集落依存度を低く維持できている群れもあれば、被害対策を行っていても、行動域を変化させ、新たな地域へ出没し、集落依存度が下がらない群れがあるなど、群れによって、集落依存度に差が見られるようになっている。

(7) サル監視員の設置状況

平成22年度から、県または市町が緊急雇用就業機会創出事業等を活用してサル監視員を設置し、平成23年度には地域個体群のあるすべての市町で合計8名のサル監視員が活動を始めた。平成24年度はサル監視員マニュアルを作成し監視員活動の技能向上を進めた。また、位置情報共有システムを整備し、監視員が携帯端末を使ってシステムに出没情報の登録を直接行えるようにした結果、関係者の情報共有が進んだ。また、携帯メールやオフトーク通信で住民へのサル位置情報の提供も行われている。サル監視員の活動によりサルの被害が軽減されている地域も多くあり、制度の拡充と継続した運用が望まれる。

平成26年度から、豊岡市では監視員の設置に代えて、市が運営するサル出没情報共有のメールシステムに住民が加入して情報を提供・共有する体制になっている。

表－3 地域個体群別サル監視員の設置状況（令和3年度）

地域個体群	大河内・生野	豊岡	美方	篠山
人数	2名	なし	2名	2名
事業主体	神河町、朝来市		香美町	丹波篠山市
主な活動内容	・群れの位置把握 ・追い払い活動 ・住民への周知助言 ・捕獲の実施		・群れの位置把握 ・追い払い活動	・群れの位置把握 ・追い払い活動 ・住民への周知助言
位置情報の住民連絡	・携帯メール連絡		・オフトーク通信	・携帯メール連絡

(8) 防護柵の設置状況

平成19年度よりサル被害対策として有効な防護柵の実証展示を行い、地域への普及をはかった。実証展示を行った防護柵は、サルが登れない構造になっている網柵（猿落君）、網タイプの電気柵（モンキーショック）、ワイヤーメッシュと電気柵を組み合わせた柵（シシ垣君）で、神河町、豊岡市、香美町、朝来市、丹波篠山市に設置した。これらの柵の中で、特にワイヤーメッシュと電気柵を組み合わせた柵で支柱部分が通電するように改良した柵（おじろ用心棒）が、防護効果の高さと設置費用、維持管理のしやすさで優れていることが明らかになり普及が進んでおり、香美町、朝来市、丹波篠山市では、補助事業を活用して普及を後押ししている。

おじろ用心棒の設置率は、神河町では低いものの、監視員による追払いとサル用防護柵の設置によって被害は減少傾向にある。豊岡市での現在の設置率は、低く推移しているが、その他の市町では、設置が進んでいる。丹波篠山市においては、ほ場設置長を比較したところ、他地域と比べ、高い設置率を示し、特に篠山C群では11%と高い値を示している。

表－4 地域個体群生息地区でのおじろ用心棒設置状況

分類 \ 市町(個体群)	城崎町 (城崎A)		小代区 (美方B)		神河町 (大河内A~C)		丹波篠山市					
	数	%	数	%	数	%	数 ※					
1 ほ場数												
電気柵	26	12.0	246	37.2	0	0.0	674					
うち おじろ用心棒	25	11.5	60	9.1	0	0.0	674					
サル用柵 他	4	1.8	51	7.7	57	14.4	0					
未設置	187	86.2	365	55.1	339	85.6	-					
	217	100.0	662	100.0	396	100.0	674					
2 ほ場設置長	% (篠山A)		% (篠山B)		% (篠山C)		% (篠山D)		% (篠山E)			
水田	0.2		2.0		0.0		7.4		4.3			
畑	1.3		5.3		0.0		0.0		0.5			
ほ場 合計	0.6		2.7		0.0		6.0		3.7			

※ 丹波篠山市は、耕作可能な、ほ場数は未定 (令和2年12月末現在)
ほ場周囲長は、GISを用い、集落の林縁から50mバッファを発生させ、それにより切り取られた集落の農地ポリゴンの田畑別の総延長に占めるおじろ用心棒の設置長を算出

(9) サル追い犬の育成状況

地域の家庭で飼われている犬を活用した追い払い活動を推進するために、平成18年度より、「サル追い犬」の育成を行っている。平成19年度からは県が作成した「兵庫県野生動物追い払い犬育成ガイドライン^{※1}」に基づいて香美町、神河町、篠山市で訓練を実施し54頭が育成された。また、丹波篠山市では市単独で令和2年度も継続してサル追い犬を育成しており、活動している頭数はオス6頭、メス8頭の合計14頭である。

表－5 兵庫県下のサル追い犬の育成状況

地区名	認定年度	頭数	オス	メス	主な犬種
神河町	H20	8	6	2	雑種、柴犬、ラブラドルレトリバー、紀州犬、秋田犬、ジャーマンシェパード、グレートピレネーズ等
香美町小代区	H19	6	3	3	
	H20	3	1	2	
	H21	3	1	2	
丹波篠山市	H23	5	2	3	
	H25	15	9	6	
	H26	2	1	1	
	H27	3	2	1	
	H28	1	1	0	
	H29	3	2	1	
	H30	2	1	1	
	R1	3	2	1	
R2	1	1	0		
合計		55(15)	32(7)	23(8)	

*合計の()内の数字は現在活動している頭数

※1 野生動物追い払い犬育成ガイドライン：兵庫県が策定したガイドラインで、市町がそれに基づいた訓練を受けた犬を「追い払い犬」として認定し、安全で効率的な追い払い活動を支援している。使用する犬は地域の家庭犬を基本とし、

ガイドラインに基づいて服従訓練を行い、一定のレベルに達した犬を認定する。あくまでも飼い主自身の周辺を守るための手段であるが、地域に追い払い犬が増えることで地域全体をニホンザルの被害から守ることにつながる可能性がある。また、家庭犬を使つての活動であるため、飼い主と犬との関係がより親密になり、より積極的な追い払い活動へと発展するため、継続的な実施につながるメリットも確認されている。

(10) 捕獲数の推移

地域個体群の年度別捕獲頭数を表－５に示した。複数の群れがいる篠山地域個体群では、平成 16 年度以降少数で推移していたが、大型捕獲檻の活用により、平成 26 年度以降、捕獲頭数が増加している。同じく複数の群れが生息する大河内・生野地域個体群では、平成 8 年度に群れの一斉捕獲※2が実施された以降は毎年の捕獲数は比較的少なく推移していたが、近年、比較的多い頭数を捕獲している。

餌付群では、佐用地域個体群で過去に高い水準で捕獲が続けられていたが、近年の捕獲数は少なくなっている。淡路地域個体群は、年によっては多数の捕獲が行われているが、近年はあまり行われていない。

※2 一斉捕獲：大型の捕獲檻を設置して一定期間餌付けをし、一つの群れごと捕獲すること。「群れ捕獲」とも言う。

表－６ 地域個体群の年度別捕獲頭数

(単位：頭)

農林	姫路	朝来	豊岡		丹波	光都	洲本	その他	県計
地域 個体群	大河内 生野		豊岡	美方	篠山	佐用	淡路	不明	
S60			3		33	1	1	2	40
S61	26		12		27				65
S62	21		4		27	4		1	57
S63	7		2		8	7		1	25
H1	18		4		86	21		1	130
H2			7		22	12		1	42
H3	1		4		17	36			58
H4	1		4		52	12		2	71
H5	1				22	1			24
H6			5		13	32			50
H7	13		8		30	12		1	64
H8	115		10		50	45	1		221
H9			11		16	22	1		50
H10			13		21	34	50	2	120
H11			8		16	37	24	1	86
H12			26	3	15	27	17		88
H13	1		10		2		4		17
H14			3		8	6	29		46
H15	2		9	1	20	7			39
H16	15		11	3	40		1	2	72
H17	10		2	3	8	3			26
H18	6		7	18	2	1	1		35
H19	10		16	10	6	1		1	44
H20	3		1	21	7		4	2	38
H21	10		3	21	12				46
H22	74		5	16	9		1	2	107
H23	24			6	3	7	1		41
H24	47		3	7	3	2			62

H25	12	3	8	10	7	8	1	49
H26	39	4	7	61	15	5		131
H27	24	4		38				66
H28	51	2		49		1		103
H29	55	3		18	10	1		87
H30	58	6		44	11	3		122
R1	36	6		17	4	8	1	72
R2	48	5		17	2	4		76

(11) 災害に強い森づくり（野生動物育成林整備 他）の実施状況

ア 全体の実績

平成 18 年度から災害に強い森づくり（第 1 期～第 3 期）に取り組んでおり、令和 2 年度までに野生動物共生林整備^{※3}を 28 市町 214 箇所^{※4}で 4,461ha、針葉樹林と広葉樹林の混交整備^{※4}を 15 市町 99 箇所^{※4}で 2,656ha、住民参画型森林整備を 25 市町 108 箇所^{※4}で 247ha、広葉樹林化促進パイロット事業を 7 市町で 91.23ha 実施している。

また、令和 3 年度から第 4 期対策に取り組んでおり、令和 8 年度までの計画量を表-8 に示す。

※3:第 2 期までの事業名は「野生動物育成林整備」 ※4: 第 2 期までの事業名は「針葉樹林と広葉樹林の混交林整備」

表-7 災害に強い森づくり実績（平成 18～令和 2 年度）

単位：面積 ha

事務所名	管内市町	野生動物共生林整備				針葉樹林と広葉樹林の混交整備			住民参画型森林整備		広葉樹林化促進パイロット事業
		箇所数	区域面積	バッファゾーン整備面積	共生林整備面積	箇所数	区域面積	広葉樹植栽面積	箇所数	区域面積	区域面積
神戸	神戸市	4	62	23.15					7	15	
	宝塚市								1	2	
阪神	川西市	2	37		20.45						
	三田市	4	101	18.67	1.73				3	6	
	猪名川町	1	29	7.19	0.12						
	加古川	加古川市	1	20	17.85				7	14	
加東	高砂市	2	60	5.46	0.00				1	2	
	西脇市	3	95	13.30	7.35	1	30	3.84			
	加西市	11	253	36.22	2.76				3	6	
姫路	多可町	10	181	53.44	5.82	15	357	24.98	1	2	9.28
	姫路市	9	155	40.01	0.76	3	91	7.75	10	23	7.08
	神河町	8	123	26.69	20.89	8	220	25.45	3	6	
	市川町	11	205	65.32	11.05	1	33	2.00	11	23	
光都	福崎町	5	87	25.26	0.23				1	4	
	相生市	6	139	49.36	0.90	1	30	2.01	1	2	
	赤穂市	2	56	12.64	0.40						
	上郡町	4	91	17.98	1.38						
	佐用町	6	123	32.21	0.17				4	11	1.05
	太子町								1	2	
	たつの市	10	250	49.53	1.74	2	69	10.39	3	6	
豊岡	宍粟市	5	103	14.88	17.25	20	592	59.62	3	8	30.90
	豊岡市	9	262	58.51	2.08	3	53	3.27	8	16	
	香美町	18	354	92.79	8.20	4	95	3.25	16	41	
朝来	新温泉町	8	227	61.05	21.17	2	66	2.83	2	5	0.60
	養父市	22	414	99.50	13.81	7	181	17.24	5	16	
	朝来市	20	389	116.66	5.35	21	536	40.72	4	9	11.86
丹波	丹波篠山市	11	218	66.59	1.14	8	242	26.50	1	2	
	丹波市	18	330	93.74	1.98	3	61	4.87	7	16	30.46
洲本	洲本市	3	92	21.83					4	8	
	南あわじ市	1	5		4.51				1	2	
	合計	214	4,461	1,119.83	151.24	99	2,656	234.72	108	247	91.23

(野生動物共生林整備)

※集計対象は、H18～R2の整備完了済の箇所数、区域面積及び整備面積

※H23以降(2期・3期)は、バッファゾーン整備・共生林整備箇所をそれぞれ1箇所としてカウント

※第3期から名称を変更

(針葉樹林と広葉樹林の混交整備)

※1期拡充をのぞき、整備(作業道、植栽)完了箇所のみ

※第3期から名称を変更

(住民参画型森林整備)

※H23～R2実施の箇所数、区域面積

(広葉樹林化促進パイロット事業)

※H24～R2の整備(更新伐)面積

表－8 「災害に強い森づくり」による森林整備 【令和4～8年度実施計画量】

区分	野生動物共生林整備			針葉樹林と 広葉樹林の 混交整備 (生息地管 理)	住民参画型 森林整備 (被害防除)
	バッファゾーン 整備 (被害防除)	共生林整備 (生息地管理)			
		広葉樹林整 備タイプ	人工林の広葉 樹林化タイプ		
箇所数	44	12	4	35	40
面積(ha)	1320	120	4	795	80

イ サルを対象とした事業実績

5市町195カ所で延べ2,457haの野生動物共生林整備や針葉樹林と広葉樹林の混交林整備を実施している。

表－9 災害に強い森づくり実施量（平成18～令和2年度）

管内市町	野生動物共生林整備				針葉樹林と広葉樹林の混交整備			住民参画型森林整備		
	箇所数	区域面積	バッファゾーン整備面積	共生林整備面積	箇所数	区域面積	広葉樹植栽面積	箇所数	区域面積	区域面積
神河町	8	123	26.32	20.89	7	203	22.45	3	6.00	
豊岡市	8	231	52.86	2.08	3	53	3.27	8	16.00	
香美町	18	354	93.18	8.20	4	95	3.25	16	41.00	
朝来市	19	357	115.56	5.35	20	522	37.72	4	9.00	11.86
丹波篠山市	9	203	59.67	1.10	8	242	26.50	1	2.00	
合計	62	1,268	347.59	37.62	42	1,115	93.19	32	74.00	11.86

(野生動物共生林整備)

※集計対象は、H18～H30の整備完了済の箇所数、区域面積及び整備面積

※H23以降(2期・3期)は、バッファゾーン整備・共生林整備箇所をそれぞれ1箇所としてカウント

※第3期から名称を変更

(針葉樹林と広葉樹林の混交整備)

※1期拡充をのぞき、整備(作業道、植栽)完了箇所のみ

※第3期から名称を変更

(住民参画型森林整備)

※H23～H30実施の箇所数、区域面積

(広葉樹林化促進パイロット事業)

※H24～H30の整備(更新伐)面積

2 遺伝子解析について


兵庫県内に生息しているニホンザルすべての群において、ミトコンドリアDNA、Y染色体遺伝子、常染色体マイクロサテライト遺伝領域を分析した。

(1) ミトコンドリアDNA

ア 兵庫県および周辺県の群れの分析

群れから離脱する可能性が無い成熟メス 33 頭のミトコンドリアDNAを分析した。(コントロール領域第2 可変領域 412bp)。

兵庫県内(淡路含む)で8つのハプロタイプが検出された。大河内・生野の3群は同じハプロタイプであった。篠山個はA群B群D群とC群E群は異なるハプロタイプであった。




図ー7 兵庫県の群れのミトコンドリアDNAハプロタイプのマップ図

イ 地域個体群間のオスの移動分析

ニホンザルのオスは性成熟すると他の群れへ移動することが知られている。オスの移動は遺伝的多様性を維持する上で重要である。そこで、地域個体群でハプロタイプが異なることを利用して、地域個体群間でのオスの移動状況を分析した。ミトコンドリア遺伝子は母系遺伝するため、オスでは1代で消失する。この性質を用いればオスの地域間移動を把握することが可能である。性成熟のオス6歳以上の個体のミトコンドリアDNAを分析し、出生個体群を判定し、地域個体群間の交流を判定した。

その結果、調査した個体において71.8%地域個体群間で移動が認められた。美方A群の4頭、篠山個体群で5頭は移動が認められなかった。オスの移動距離の平均は37km±5.7(SD)であった。最大距離は、京都北部舞鶴から大河内・生野まで約100km移動が認められた。最小距離は城崎から美方で約24km移動が認められた。京都北部、京丹后市伊根町で捕獲され電波発信器を装着した個体が、大河内・生野で捕獲されている(平成28年1月)。近

畿地方に生息しているニホンザルオスの長距離移動が電波発信器においても確認されている。




図ー8 ミトコンドリアDNAハプロタイプ分析によるオスの稼働状況

(2) Y染色体遺伝子


ミトコンドリアDNAの分析では、オスの移動は証明できても、実際に繁殖を介して遺伝子交流が起きているか証明することができない。そこで、父系遺伝するY染色体遺伝子マイクロサテライト3座位 (DYS472, DYA569, DYS645) を分析し、地域間での遺伝子交流を分析した。オス85個体を分析した。その結果、合計11のハプロタイプが検出された。美方6タイプ、城崎3タイプ、佐用5タイプ、大河内・生野6タイプ、篠山7タイプ、淡路1タイプであった。サンプルサイズのバイアスをハプロタイプリッチネスnr (Gouded, J. 2001)で補正し比較した。その結果、美方、城崎(豊岡)と大河内・生野、篠山の間で有意な差が認められた($P < 0.05$)。美方、城崎(豊岡)は、遺伝子交流はあるが、交流は少なかった。

2つの地域個体群は、個体数が他の地域個体群と比較して少ないこと、所属するメスの数が少ないことが一つの原因だと考えられた。今後、さらに詳細に分析している予定である。



n=分析サンプル数

図-9 兵庫県のニホンザルY染色体ハプロタイプの数



n_r の値が大きければ遺伝的交流も多い

参考データ：兵庫県以外の情報を加えた。

下北、五葉山、白神、南東北（Kawamoto. 2008）三重（六波羅ら 2013）

図 10 全国のニホンザルのY染色体遺伝子による遺伝的交流の程度

(3) 常染色体遺伝子の分析

常染色体マイクロサテライト遺伝領域は父系母系の遺伝子が受け継がれ、多様性を把握する上で優れている。そこで常染色体マイクロサテライト計 16 座位

(D4S2365, D13S765, D18S537, D20S484, D7S821, D10S611, D14S306, D8S1106, D12S375, D15S644, D5S1457, D17S1290) について分析を行った。各地域個体群に所属する 32 個体 (オス 16 メス 16) 合計、192 頭を分析した。それぞれの地域個体群の H_e 期待値、 H_o 観察値を図-11 に示した。各地域個体群との間に有意な差は認められなかった。

島嶼隔離されている淡路島の H_e は 0.408 と低かった ($P < 0.05$)。本州部に生息している個体群の遺伝的多様性は高かった。しかし、美方、城崎 (豊岡) は個体数が少ないこと、Y染色体遺伝子のハプロタイプの数が少ないことから、急速に遺伝的多様性を消失される可能性もある。今後とも遺伝的モニタリングを継続し捕獲数をコントロールすることが重要である。




図 1 1 兵庫県ニホンザル常染色体遺伝子マイクロサテライトの異型接合の割合

3 計画の実施体制

